



**Propiedad/Aut** Jorge R. Sánchez González

**SISTCODSUP:** PSE028DUR004

**SISTCODINF:** No aplica

**Nombre** Pseudochondrostoma duriense

**Nombre común:**

Boga del duero

**Sinónimo:**

No aplica

**Propiedades:**

HÁBITAT: Continental.

PROCEDENCIA: Autóctono(Endémico:Península Ibérica).

**Descripción:**

Pez de tamaño medio que por lo general no llega a los 50 cm de longitud total. Cuerpo fusiforme y comprimido lateralmente, más alargado que otras especies de ciprinidos. Boca en posición ínfera, recta y con un labio inferior grueso provisto de una lámina córnea bien desarrollada. 5-5 dientes faríngeos. Línea lateral con 63-74 escamas. 12-24 branquiespinas. Aletas dorsal y anal largas, con 8 radios ramificados, aunque ocasionalmente pueden ser 9. Cuerpo frecuentemente pigmentado con marcadas y pequeñas manchas negras

**Ecología:**

Especie gregaria que habita aguas de corriente en los tramos medios de los ríos, aunque también puede proliferar en embalses. Realiza migraciones gregarias pre-reproductivas aguas arriba. La época de reproducción se da entre abril y junio. Durante la freza los machos desarrollan tubérculos nupciales muy pequeños por todo el cuerpo. Su alimentación se basa esencialmente en vegetación aunque también puede ingerir pequeños invertebrados y detritus. Los individuos de *P. duriense* pueden hibridar con *A. oligolepis*

**Ruta**

Clase Actinopterygii > Familia Cyprinidae > Género Pseudochondrostoma > Especie Pseudochondrostoma duriense

**Ruta del árbol:**

- \* Peces con mandíbula. Con un par de aberturas branquiales protegidas por opérculos. Presenta aletas pares. Boca sin este conjunto de características
- \* Sin este conjunto de caracteres
- \* Cuerpo no serpentiforme. Aletas dorsal, caudal y anal no fundidas en una sola
- \* Sin este conjunto de caracteres
- \* Sin este conjunto de caracteres
- \* Sin aleta adiposa
- \* Boca con 0, 2 ó 4 barbillones
- \* Sin esta característica
- \* Sin este conjunto de caracteres
- \* Sin este conjunto de caracteres
- \* O una sola aleta o dos aletas dorsales no separadas
- \* Boca con 0, 1 ó 2 pares de barbillones. Una sola aleta dorsal
- \* Sin barbillones peribucales
- \* Aleta anal con 7 ó más radios ramificados
- \* Labio inferior provisto de lámina córnea; boca recta o arqueada, en posición ínfera o subterminal
- \* Boca recta (arqueada apenas en *P. duriense* cuya línea lateral posee 63-74 escamas); desprovisto de barra oscura en la línea lateral
- \* Profundidad del pedúnculo caudal 1.9-2.1 veces su longitud; 6-5 o 5-5 dientes faríngeos; 1/2 10-12/1/5-6 escamas en series transversales entre el origen de la aleta dorsal y pélvica; aleta anal con 8-9 1/2 radios ramificados; 18-31 branquiespinas
- \* Borde de la mandíbula inferior ligeramente arqueada; 5-5 dientes faríngeos; aleta anal por lo general con 8 1/2 radios ramificados; 18-24 branquiespinas; los individuos de Portugal y Galicia presentan numerosos puntos negros en el dorso (desde el Duero hasta Galicia)

**Índices y métricas:**

No aplica

## LOCALIZACIÓN DEL TAXÓN

### **Demarcación Hidrográfica**

- Miño-Sil
- Cantábrico Occidental
- Duero
- Júcar

### **Tipo de masa de agua**

#### **CATEGORÍA RÍOS**

- 121 - Ríos Cantabro-Atlánticos silíceos
- 112 - Ríos de montaña Mediterránea calcárea
- 114 - Ejes Mediterráneos de baja altitud
- 125 - Ríos de montaña húmeda silícea
- 131 - Pequeños ejes Cantabro-Atlánticos silíceos
- 127 - Ríos de alta montaña
- 109 - Ríos mineralizados de baja montaña Mediterránea
- 128 - Ejes fluviales principales Cantabro-Atlánticos silíceos